



English
Indications for Use
 This reservoir is indicated for the subcutaneous infusion of insulin from compatible Medtronic insulin pumps and Medtronic Extended infusion sets. Refer to your Medtronic insulin pump user guide for compatibility.
Contraindications
 This reservoir is contraindicated for the infusion of blood or blood products.
Warnings
 Do not use this reservoir with two or three day infusion sets. The reservoir may only be used for up to seven days of use of the Medtronic Extended infusion set. Use of the reservoir with two or three day infusion sets may lead to hyperglycemia or diabetic ketoacidosis.
 - Do not use the reservoir for more than seven days. Using the reservoir for more than seven days may result in the delivery of too little insulin, which may cause hypoglycemia.
 - Reservoir and transfer guard are sterile, nonpyrogenic, and for single use.
 - Do not reuse or reutilize. Reuse of the reservoir may lead to any one of the following: insulin degradation, infection, inaccurate medication delivery, or leaks which may cause damage to the pump.
 - Do not use if package has been opened or damaged.
 - Dispose of transfer guard safely in sharps container.
 - Failure to remove trapped air from reservoir may result in inaccurate delivery of medication.
 - If insulin, or any liquid, gets inside the tubing connector, it can temporarily block the vents that allow the pump to properly fit the infusion set. **This may result in the delivery of too little or too much insulin, which can cause hypoglycemia or hyperglycemia.** If this occurs, start over with a new reservoir and infusion set.
Warranty
 Visit <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

Español
Indicaciones de uso
 Este reservorio es indicado para la infusión subcutánea de insulina desde bombas de insulina de Medtronic compatibles y equipos de infusión Medtronic Extended.
Contraindicaciones
 Este reservorio no debe utilizarse para la infusión de sangre o productos sanguíneos.
Avisos
 - No utilice con equipos de infusión indicados para dos o tres días.
 El reservorio solo se puede utilizar durante un máximo de siete días con el equipo de infusión Medtronic Extended. Si el reservorio se utiliza con equipos de infusión para dos o tres días puede provocar hiperglucemia o una hipoglucemía o una hipoglucemía.
 - Una vez que se ha llenado el reservorio, debe utilizarlo de inmediato. No lo guarde.
 - Compruebe que no existen pérdidas en el reservorio ni en el equipo de infusión.
 - Lleve a cabo la primera configuración bajo la supervisión de su equipo médico.
Garantía
[Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Reservorio hecho de plástico. Medtronic, el logotipo de Medtronic y Further, juntos son marcas comerciales de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas comerciales de una compañía de Medtronic.

Norsk
Indikasjoner for bruk
 Dette reservoaret er indikert for subkutan infusjon av insulin ved hjelp av kompatible Medtronic-insulinpumper og Medtronic Extended-slangsett. Du finner informasjon om kompatibilitet i bruksanvisningen for Medtronic-insulinpumper.
Kontraindikasjoner
 Dette reservoaret er kontraindikert for infusjon av blod eller blodprodukter.
Advarsler
 - Bruk ikke reservoaret med slangesett for to eller tre dager. Reservoaret skal kun brukes under et maksimalt tidsrom på syv dager med et Medtronic Extended-slangsett. Bruk av reservoaret med slangesett for to eller tre dager kan føre til hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose.
 - Når du har fylt reservoaret, må du bruke det umiddelbart. Ikke oppbevar det.
 - Kontroller om det er lekkasje etter at du har byttet reservoaret og slangesettet.
 - Diabetestestet skal være til stede først gang du klargjør utstyret.
Garanti
[Se <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Reservoaret er laget av plast. Medtronic, Medtronic logo og Further, sammen med merkene til Medtronic. Alle andre merker er varemærker som tilhører Medtronic.

English
Indications for Use
 This reservoir is indicated for the subcutaneous infusion of insulin from compatible Medtronic insulin pumps and Medtronic Extended infusion sets. Refer to your Medtronic insulin pump user guide for compatibility.
Contraindications
 This reservoir is contraindicated for the infusion of blood or blood products.
Warnings
 Only rapid-acting U-100 insulin, as prescribed by your physician, should be used with this reservoir.
Precautions
 - Read all instructions carefully before using the Medtronic Extended Reservoir.
 - Insulin should be at room temperature before filling reservoir.
 - Once reservoir is filled, use promptly. Do not store.
 - Check for leaks after changing the reservoir and infusion set.
 - Conduct your first setup in the presence of your healthcare professional.
Warranty
 Visit <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic. All other brands are trademarks of a Medtronic company.

French
Indications d'utilisation
 Ce réservoir est indiqué pour la perfusion sous-cutanée d'insuline avec les pompes à insuline de Medtronic et les cathéters de Medtronic Extended compatibles.
Référez-vous au manuel d'utilisation de votre pompe à insuline de Medtronic pour la compatibilité.
Contraindications
 Ce réservoir est contre-indiqué pour l'infusion de sang ou de produits sanguins.
Avertissements
 • Utilisation de ce réservoir pour la perfusion de sang ou autre produit sanguin est contre-indiquée.
Précautions
 • N'utilisez pas ce réservoir avec les cathéters prévus pour deux ou trois jours. Le réservoir peut uniquement être utilisé pendant un maximum de sept jours avec le cathéter de Medtronic Extended. L'utilisation du réservoir avec des cathéters prévus pour deux ou trois jours peut conduire à une hyperglycémie ou une acidose diabétique.
 • N'utilisez pas le réservoir pendant plus de sept jours. L'utilisation du réservoir pendant plus de sept jours peut entraîner l'administration d'une quantité insuffisante d'insuline susceptible de provoquer une hypoglycémie.
 • Le réservoir et la baïque de transfert sont stériles, apyrégéniques et à usage unique exclusivement.
 • Nous recommandons d'effectuer la première mise en place en présence de votre professionnel de santé.
Garantie
 Consulter <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et Further, Together sont des marques commerciales de Medtronic. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société Medtronic.

Français
Indications d'utilisation
 Ce réservoir est indiqué pour la perfusion sous-cutanée d'insuline avec les pompes à insuline de Medtronic et les cathéters de Medtronic Extended compatibles.
Référez-vous au manuel d'utilisation de votre pompe à insuline de Medtronic pour la compatibilité.
Contraindications
 Ce réservoir est contre-indiqué pour l'infusion de sang ou de produits sanguins.
Avertissements
 • Évitez que de l'insuline ou tout autre liquide ne pénètre dans le connecteur de la tubulure ; cet peut temporairement bloquer les événements qui permettent à la pompe de remplir le cathéter correctement. **Ceci peut entraîner l'administration d'une quantité insuffisante ou excessive d'insuline susceptible de provoquer une hypoglycémie ou une hyperglycémie.** Dans ce cas, recommencez avec un nouveau réservoir et un nouveau cathéter.
 • Il convient d'utiliser uniquement l'insuline U-100 à action rapide, prescrite par votre médecin, avec ce réservoir.
Garantie
 Consulter <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et Further, Together sont des marques commerciales de Medtronic. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société Medtronic.

French
Indications d'utilisation
 Ces réservoirs sont destinés à la perfusion sous-cutanée d'insuline avec les pompes à insuline de Medtronic et les dispositifs d'infusions de Medtronic Extended.
Contraindications
 Ces réservoirs doivent être utilisés pour l'infusion de sang ou de produits sanguins.
Précautions
 • Ne pas utiliser ce réservoir avec les cathéters prévus pour deux ou trois jours. Le réservoir peut uniquement être utilisé pendant un maximum de sept jours avec le dispositif de transfert de Medtronic Extended. L'utilisation du réservoir avec des cathéters prévus pour deux ou trois jours peut entraîner une hyperglycémie ou une acidose diabétique.
 • Ne pas utiliser ce réservoir pendant plus de sept jours. L'utilisation du réservoir pendant plus de sept jours peut entraîner l'administration d'une quantité insuffisante d'insuline susceptible de provoquer une hypoglycémie.
 • Le réservoir et la baïque de transfert sont stériles, apyrégéniques et à usage unique exclusivement.
 • Nous recommandons d'effectuer la première mise en place en présence de votre professionnel de santé.
Garantie
 Consulter <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tous droits réservés. Medtronic, le logo de Medtronic et Further, Together sont des marques commerciales de Medtronic. Toutes les autres marques sont des marques commerciales d'une société Medtronic.

Deutsch
Verwendungszweck
 Dieses Reservoir ist indiziert zur Verwendung bei der subkutanen Infusion von Insulin mit kompatiblen Medtronic-Insulinpumpen und Medtronic Extended Infusionssets.
 Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Medtronic-Insulinpumpe.
Kontraindikationen
 Dieses Reservoir darf nicht für die Infusion von Blut oder Blutprodukten eingesetzt werden.
Warnhinweise
 • Nicht mit Infusionssets einsetzen, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können. Das Reservoir darf nur bis zu sieben Tage verwendet werden, wenn es mit einem Medtronic Extended-Infusionssets eingesetzt wird.
 • Verwenden Sie Reservoirs mit Infusionssets, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können, kann es zu Hyperglykämie oder diabetischer Ketoacidose kommen.
Garantie
 Siehe <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic Logo sowie Further, Together sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic-Unternehmens.

Deutsch
Verwendungszweck
 Dieses Reservoir ist indiziert zur Verwendung bei der subkutanen Infusion von Insulin mit kompatiblen Medtronic-Insulinpumpen und Medtronic Extended Infusionssets.
 Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Medtronic-Insulinpumpe.
Kontraindikationen
 Dieses Reservoir darf nicht für die Infusion von Blut oder Blutprodukten eingesetzt werden.
Warnhinweise
 • Nicht mit Infusionssets einsetzen, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können. Das Reservoir darf nur bis zu sieben Tage verwendet werden, wenn es mit einem Medtronic Extended-Infusionssets eingesetzt wird.
 • Verwenden Sie Reservoirs mit Infusionssets, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können, kann es zu Hyperglykämie oder diabetischer Ketoacidose kommen.
Garantie
 Siehe <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic Logo sowie Further, Together sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic-Unternehmens.

Deutsch
Verwendungszweck
 Dieses Reservoir ist indiziert zur Verwendung bei der subkutanen Infusion von Insulin mit kompatiblen Medtronic-Insulinpumpen und Medtronic Extended Infusionssets.
 Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Medtronic-Insulinpumpe.
Kontraindikationen
 Dieses Reservoir darf nicht für die Infusion von Blut oder Blutprodukten eingesetzt werden.
Warnhinweise
 • Nicht mit Infusionssets einsetzen, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können. Das Reservoir darf nur bis zu sieben Tage verwendet werden, wenn es mit einem Medtronic Extended-Infusionssets eingesetzt wird.
 • Verwenden Sie Reservoirs mit Infusionssets, die für zwei oder drei Tage verwendet werden können, kann es zu Hyperglykämie oder diabetischer Ketoacidose kommen.
Garantie
 Siehe <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Alle Rechte vorbehalten. Medtronic, das Medtronic Logo sowie Further, Together sind Marken von Medtronic. Alle anderen Marken sind Marken eines Medtronic-Unternehmens.

Italiano
Indicazioni per l'uso
 Il serbatoio è indicato per l'infusione sottocutanea di insulina con i set di infusione E-100-1suline, Medtronic Extended e i serbatoi di insulina Medtronic compatibili. Per la compatibilità, fare riferimento alla guida del microinfusore.
Controindicazioni
 Il serbatoio è contraindicato per l'infusione di sangue o prodotti sanguigni.
Avvertenze
 • Non usare con i serbatoi per due- o di tre giorni. Il serbatoio può essere utilizzato con i serbatoi di infusione Medtronic Extended. Si consiglia di utilizzare con i serbatoi di infusione Medtronic Extended.
 • Non utilizzare il serbatoio per più di sette giorni. L'utilizzo del serbatoio per più di sette giorni può infatti determinare un'erezione di insulina a dosaggi troppo bassi, con conseguente rischio di ipoglicemia.
 • Non utilizzare il serbatoio se è stato aperto o danneggiato.
 • Desechate il protettore di trasferenza di forma segura in un recipiente per oggetti contattanti.
Garanzia
 Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, insieme ai simboli di fabbrica di Medtronic. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica di una società Medtronic.

Italiano
Indicazioni per l'uso
 Il serbatoio è indicato per l'infusione sottocutanea di insulina con i set di infusione E-100-1suline, Medtronic Extended e i serbatoi di insulina Medtronic compatibili. Per la compatibilità, fare riferimento alla guida del microinfusore.
Controindicazioni
 Il serbatoio è contraindicato per l'infusione di sangue o prodotti sanguigni.
Avvertenze
 • Non usare con i serbatoi per due- o di tre giorni. Il serbatoio può essere utilizzato con i serbatoi di infusione Medtronic Extended. Si consiglia di utilizzare con i serbatoi di infusione Medtronic Extended.
 • Non utilizzare il serbatoio per più di sette giorni. L'utilizzo del serbatoio per più di sette giorni può infatti determinare un'erezione di insulina a dosaggi troppo bassi, con conseguente rischio di ipoglicemia.
 • Non utilizzare il serbatoio se è stato aperto o danneggiato.
 • Desechate il protettore di trasferenza di forma segura in un recipiente per oggetti contattanti.
Garanzia
 Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, insieme ai simboli di fabbrica di Medtronic. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica di una società Medtronic.

Italiano
Indicazioni per l'uso
 Il serbatoio è indicato per l'infusione sottocutanea di insulina con i set di infusione E-100-1suline, Medtronic Extended e i serbatoi di insulina Medtronic compatibili. Per la compatibilità, fare riferimento alla guida del microinfusore.
Controindicazioni
 Il serbatoio è contraindicato per l'infusione di sangue o prodotti sanguigni.
Avvertenze
 • Non usare con i serbatoi per due- o di tre giorni. Il serbatoio può essere utilizzato con i serbatoi di infusione Medtronic Extended.
 • Non utilizzare il serbatoio per più di sette giorni. L'utilizzo del serbatoio per più di sette giorni può infatti determinare un'erezione di insulina a dosaggi troppo bassi, con conseguente rischio di ipoglicemia.
 • Non utilizzare il serbatoio se è stato aperto o danneggiato.
 • Desechate il protettore di trasferenza di forma segura in un recipiente per oggetti contattanti.
Garanzia
 Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, insieme ai simboli di fabbrica di Medtronic. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica di una società Medtronic.

Italiano
Indicazioni per l'uso
 Il serbatoio è indicato per l'infusione sottocutanea di insulina con i set di infusione E-100-1suline, Medtronic Extended e i serbatoi di insulina Medtronic compatibili. Per la compatibilità, fare riferimento alla guida del microinfusore.
Controindicazioni
 Il serbatoio è contraindicato per l'infusione di sangue o prodotti sanguigni.
Avvertenze
 • Non usare con i serbatoi per due- o di tre giorni. Il serbatoio può essere utilizzato con i serbatoi di infusione Medtronic Extended.
 • Non utilizzare il serbatoio per più di sette giorni. L'utilizzo del serbatoio per più di sette giorni può infatti determinare un'erezione di insulina a dosaggi troppo bassi, con conseguente rischio di ipoglicemia.
 • Non utilizzare il serbatoio se è stato aperto o danneggiato.
 • Desechate il protettore di trasferenza di forma segura in un recipiente per oggetti contattanti.
Garanzia
 Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.
 © 2020 Medtronic. Tutti i diritti riservati. Medtronic, il logo Medtronic e Further, insieme ai simboli di fabbrica di Medtronic. Tutti gli altri nomi commerciali sono marchi di fabbrica di una società Medtronic.

Svenska
Indikationer för användning
 Denna reservoar är indikeras för subkutan infusions av insulin från kompatibla infusionssett från Medtronic och Medtronic Extended-infusionssett. Se användarhandboken till den Medtronic-insulinpump för kompatibilitet.
Kontraindikationer
 Reservoaren är kontraindikerad för infusions av blod eller blodprodukter.
Varningar
 • Färs inte användas med två- eller tredags infusionssett. Reservoaren är endast indikeras för att användas med settet från Medtronic Extended-infusionssett. Om reservoaren används med slangesett för två- eller tredags kan det föra till hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose.
Takku
[Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Kalki ökade rörelser. Medtronic, Medtronic logo och Further, tillsammans med fabrikens symboler.

Svenska
Indikationer för användning
 Denna reservoar är indikeras för subkutan infusions av insulin från kompatibla infusionssett från Medtronic och Medtronic Extended-infusionssett. Se användarhandboken till den Medtronic-insulinpump för kompatibilitet.
Kontraindikationer
 Reservoaren är kontraindikerad för infusions av blod eller blodprodukter.
Varningar
 • Färs inte användas med två- eller tredags infusionssett. Reservoaren är endast indikeras för att användas med settet från Medtronic Extended-infusionssett. Om reservoaren används med slangesett för två- eller tredags kan det föra till hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose.
Takku
[Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Kalki ökade rörelser. Medtronic, Medtronic logo och Further, tillsammans med fabrikens symboler.

Svenska
Indikationer för användning
 Denna reservoar är indikeras för subkutan infusions av insulin från kompatibla infusionssett från Medtronic och Medtronic Extended-infusionssett. Se användarhandboken till den Medtronic-insulinpump för kompatibilitet.
Kontraindikationer
 Reservoaren är kontraindikerad för infusions av blod eller blodprodukter.
Varningar
 • Färs inte användas med två- eller tredags infusionssett. Reservoaren är endast indikeras för att användas med settet från Medtronic Extended-infusionssett. Om reservoaren används med slangesett för två- eller tredags kan det föra till hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose.
Takku
[Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Kalki ökade rörelser. Medtronic, Medtronic logo och Further, tillsammans med fabrikens symboler.

Svenska
Indikationer för användning
 Denna reservoar är indikeras för subkutan infusions av insulin från kompatibla infusionssett från Medtronic och Medtronic Extended-infusionssett. Se användarhandboken till den Medtronic-insulinpump för kompatibilitet.
Kontraindikationer
 Reservoaren är kontraindikerad för infusions av blod eller blodprodukter.
Varningar
 • Färs inte användas med två- eller tredags infusionssett. Reservoaren är endast indikeras för att användas med settet från Medtronic Extended-infusionssett. Om reservoaren används med slangesett för två- eller tredags kan det föra till hyperglykemi eller diabetisk ketoacidose.
Takku
[Visite <http://www.medtronicdiabetes.com/warranty>.](http://www.medtronicdiabetes.com/warranty)
 © 2020 Medtronic. Kalki ökade rörelser. Medtronic, Medtronic logo och Further, tillsammans med fabrikens symboler.

<